

Biópsia da próstata

Exame diagnóstico de cancro da próstata

A necessidade de biópsia da próstata deve ser determinada baseada no nível do antígeno prostático específico (PSA) e/ou suspeita pelo toque retal. A idade do paciente, comorbilidades, história familiar e as consequências terapêuticas também devem ser consideradas na indicação da biópsia.

A biópsia é guiada por ecografia transrectal, com anestesia local através de um bloqueio nervoso peri-prostático.



PREPARAÇÃO:

Antibioticoterapia: A toma de Antibiótico deve obrigatoriamente preceder a realização da biópsia. O doente deverá iniciar no dia anterior e continuar num total de pelo menos 4 dias (dia da biópsia inclusive).

Salvo indicação do Médico Assistente e/ou Urologista, o regime a efetuar deverá ser ciprofloxacina oral na dosagem de 500 mg a cada 12 horas.

Preparação intestinal: O doente deve efetuar dois clister de limpeza (microlax®) 4 horas antes do procedimento.

Não deverá estar em jejum.

No caso de tomar Aspirina, clopidogrel, ticlopidina ou varfarina (AAS®, Tromalyt®, Ticlid ®, Sintron®, Varfine®) deverá obrigatoriamente referenciar durante a marcação do exame bem como previamente á execução da biópsia para que seja programado o ajuste terapêutico adequado.

Ainda que seguro, este procedimento tem como complicações mais frequentes a hemorragia autolimitada (esperma, urina e fezes) e a infeção urinária.

Contacte-nos para marcar:

22 5020500

www.imagemmedicadalapa.pt

imagemmedicadalapa@gmail.com

